


# Primeros auxilios en caso de una sobredosis de opioides



La naloxona es un medicamento seguro que puede revertir los efectos de una sobredosis de opioides. Solo funciona con opioides, como el fentanilo. Se ha encontrado fentanilo en muchas drogas, incluidas la cocaína y metanfetamina. La naloxona es segura de usar incluso si no hay opioides presentes. Las personas que usan drogas que no son opioides aún pueden estar en riesgo de una sobredosis.

**Encuentre el kit de naloxona almacenado aquí:**

---

---

## Los signos de una sobredosis de opioides incluyen:

- falta de respuesta o pérdida del conocimiento
- respiración lenta o detenida
- labios o puntas de los dedos azules, grises o blancos
- ronquido o sonidos de gorgoteo
- rigidez o rigidez muscular

Si cree que una persona está experimentando una sobredosis, grítele al oído para ver si responde. Si no responde, oprima sus nudillos contra el esternón de la persona (frote el esternón).

## Si no responde cuando le frota el esternón:

1. Llame al **911** para obtener ayuda médica.

2. Administre naloxona a la persona: abra el paquete, coloque la boquilla en una fosa nasal y presione el émbolo.


- Si no hay respuesta en dos minutos, aplique una segunda dosis en la otra fosa nasal.

3. Si la persona no responde después de la naloxona, administre respiración boca a boca o RCP (se incluye un protector facial en el kit de naloxona).

- Incline la cabeza de la persona hacia atrás y pellizque su nariz. Dé dos respiraciones para comenzar, luego una respiración cada cinco segundos.
- Verifique que el pecho de la persona se eleve.

4. Cuando no esté dando naloxona o respiración boca a boca, coloque a la persona de lado para evitar que se ahogue.

5. Quédese con la persona hasta que llegue la ayuda médica.



**Desprenda**

**Coloque**

**Presione**

Para obtener más información, escanee el código QR o visite [nyc.gov/health/naloxone](https://nyc.gov/health/naloxone).



**NYC**  
Health