



Décès dus à une surdose parmi les New-Yorkais latino-américains en 2021

Bien que généralement désignés comme un groupe à eux-seuls, les Latino-américains de la ville de New York (New York City, NYC) représentent plus de 20 pays d'origine ou de groupes d'ascendance différents. Cette fiche d'information présente les différences relatives aux décès par surdose parmi les principaux groupes d'ascendance latine à NYC : porto-ricains, dominicains, centre-américains et sud-américains, et mexicains.


Les New-Yorkais latino-américains comptaient le plus grand nombre de décès par surdose.




Les New-Yorkais latino-américains enregistraient le deuxième plus grand taux de décès par surdose (pour 100 000 habitants).



Les New-Yorkais latino-américains représentent 28 % de la population de NYC. Les principaux groupes d'ascendance latine à NYC sont de Porto Rico et de la République dominicaine.




Les New-Yorkais latino-américains représentent 34 % des décès par surdose. Par rapport aux estimations de la population, les New-Yorkais porto-ricains avaient une proportion plus élevée de décès par surdose.




Source : Estimations des populations cibles provenant de la base de données Série intégrée de microdonnées à grande diffusion (Integrated Public Use Microdata Series) du bureau d'enquête communautaire américaine du recensement des États-Unis (U.S. Census American Community Survey), 2016-2020. Données de la population cible latino-américaine provenant des estimations de population du Département de la santé et de l'hygiène mentale de NYC (Département de la santé de NYC), modifiées des estimations de population interpolées et intercensitaires du bureau de recensement des États-Unis (U.S. Census Bureau), 2000-2020 (mise à jour en octobre 2021). Les données relatives à la mortalité par surdose concernaient uniquement les personnes âgées de 15 à 84 ans et proviennent du Bureau du médecin légiste en chef de la ville de NYC (NYC Office of the Chief Medical Examiner) et du bureau des statistiques de l'état civil (Bureau of Vital Statistics) du Département de la santé et de l'hygiène mentale de NYC, datant de 2021. Dans le cadre de cette publication, le groupe d'ascendance est indiqué sur le certificat de décès, et s'il n'est pas mentionné, la mention « inconnu » est ajoutée. Analyses du Bureau d'étude de la consommation, de la prévention, des soins et des traitements de l'alcool et des drogues (Bureau of Alcohol, Drug Use, Prevention, Care and Treatment). Les données de 2021 sont provisoires et soumises à modification.

Parmi les New-Yorkais latino-américains, les New-Yorkais porto-ricains comptaient le plus grand nombre de décès par surdose. Les informations relatives au groupe d'ascendance ne figuraient pas sur un tiers des certificats de décès des New-Yorkais latino-américains décédés à cause d'une surdose.




Le taux de décès par surdose des New-Yorkais porto-ricains était plus élevé que celui des New-Yorkais latino-américains en général.



*Les données manquantes ne peuvent pas être prises en compte lors du calcul des taux.

Parmi les New-Yorkais porto-ricains, le taux de décès par surdose était le plus élevé chez les hommes et les personnes âgées de 35 à 54 ans.

■ Latino-américain □ Porto-ricain



Substances impliquées dans les décès par surdose chez les New-Yorkais latino-américains (les décès par surdose peuvent impliquer plusieurs substances) :

