


# Zgony z powodu przedawkowania wśród mieszkańców dzielnicy Brooklyn, 2022 r.


**692** mieszkańców dzielnicy Brooklyn zmarło z powodu przedawkowania narkotyków.

Wśród mieszkańców dzielnicy Brooklyn odnotowano drugą największą liczbę zgonów z powodu przedawkowania.




**32,2** mieszkańców dzielnicy Brooklyn na 100 000 zmarło z powodu przedawkowania narkotyków.


Wśród mieszkańców dzielnicy Brooklyn odnotowano drugi pod względem niskości odsetek zgonów z powodu przedawkowania (na 100 000 mieszkańców).




Największą liczbę zgonów z powodu przedawkowania odnotowano wśród mieszkańców dzielnicy Brooklyn w wieku od 55 do 84 lat.




Najwyższy odsetek zgonów z powodu przedawkowania odnotowano wśród mieszkańców dzielnicy Brooklyn w wieku od 55 do 84 lat.




Największą liczbę zgonów z powodu przedawkowania odnotowano wśród czarnoskórych mieszkańców dzielnicy Brooklyn.



Najwyższy odsetek zgonów z powodu przedawkowania odnotowano wśród mieszkańców dzielnicy Brooklyn pochodzenia latynoskiego.



Substancje, których dotyczyły zgony z powodu przedawkowania narkotyków wśród białych nowojorczyków (mogą dotyczyć więcej niż jednej substancji):



**Źródło:** Biuro Głównego Lekarza Medycyny Sądowej (Office of the Chief Medical Examiner) miasta Nowy Jork i Urzędu ds. Danych Demograficznych (Bureau of Vital Statistics) Wydziału Zdrowia i Higieny Psychiczej miasta Nowy Jork (New York City Department of Health and Mental Hygiene), 2022 r. Analiza przeprowadzona przez Biuro ds. Alkohol, Używania Narkotyków, Profilaktyki, Opieki i Leczenia (Bureau of Alcohol, Drug Use, Prevention, Care and Treatment). Dane za rok 2022 są prowizoryczne i mogą ulec zmianie.