


الوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة بين سكان منطقة Manhattan، لعام 2022


من سكان Manhattan من بين كل 100000 من السكان توفوا بسبب تناول جرعة زائدة من العقاقير. **34.4**

سجل سكان منطقة Manhattan ثالث أعلى معدل للوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة (من بين كل 100000 من السكان).




من سكان منطقة Manhattan توفوا بسبب تعاطي جرعة زائدة من المخدرات. **466**


سجل سكان منطقة Manhattan ثاني أقل عدد للوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة.




سجل سكان Manhattan الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 54 عامًا أعلى معدلات الوفاة الناتجة عن تناول جرعة زائدة.




سجل سكان Manhattan الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 54 عامًا أكبر عدد لحالات الوفاة الناتجة عن تناول جرعة زائدة.




سجل سكان منطقة Manhattan من السود أعلى معدل للوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة.



سجل سكان منطقة Manhattan ذوو الأصل اللاتيني عدد أكبر للوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة.



المواد المرتبطة بالوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة من المخدرات (من الممكن أن ترتبط الوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة بأكثر من نوع واحد من المواد):



المصدر: مكتب Office of the Chief Medical Examiner (مكتب كبير الأطباء الشرعيين) في مدينة نيويورك ومكتب إحصاءات الأحوال المدنية التابع لإدارة الصحة والسلامة العقلية في مدينة نيويورك، لعام 2022. تحليل أعده مكتب Bureau of Alcohol, Drug Use, Prevention, Care and Treatment (مكتب الوقاية وتقديم الرعاية والعلاج لحالات إدمان الكحول والمخدرات). لبيانات لعام 2022 مؤقتة وخاضعة للتغيير.

