


Staten Island নাগরিকদের মধ্যে ওভারডোজ-জনিত মৃত্যু, 2021


146 Staten Island নাগরিক ওষুধের ওভারডোজের কারণে মারা গেছেন।

39.3 জন নাগরিক, প্রতি 100,000 জনের মধ্যে, ওষুধের ওভারডোজের কারণে মারা গেছেন।


Staten Island নাগরিকদের মধ্যে ওভারডোজ-জনিত মৃত্যুর সংখ্যা সর্বনিম্ন ছিল।




Staten Island নাগরিকদের মধ্যে ওভারডোজ-জনিত মৃত্যুর হার দ্বিতীয় সর্বনিম্ন ছিল (প্রতি 100,000 নাগরিকের মধ্যে)।




35 থেকে 54 বছর বয়সী Staten Island নাগরিকদের মধ্যে ওভারডোজ-জনিত মৃত্যুর সংখ্যা ছিল সর্বাধিক।




35 থেকে 54 বছর বয়সী Staten Island নাগরিকদের মধ্যে ওভারডোজ-জনিত মৃত্যুর হার ছিল সর্বোচ্চ।




শ্বেতাঙ্গ Staten Island নাগরিকদের মধ্যে ওভারডোজ-জনিত মৃত্যুর সংখ্যা ছিল সর্বাধিক।



শ্বেতাঙ্গ Staten Island নাগরিকদের মধ্যে ওভারডোজ-জনিত মৃত্যুর হার ছিল সর্বোচ্চ।



ওষুধের ওভারডোজ-জনিত মৃত্যুর সাথে জড়িত পদার্থসমূহ (ওভারডোজ-জনিত মৃত্যুতে একাধিক পদার্থ জড়িত থাকতে পারে):



উৎস: নিউ ইয়র্ক রাজ্যের মুখ্য চিকিৎসা পরীক্ষকের দপ্তর (New York City Office of the Chief Medical Examiner) এবং নিউ ইয়র্ক রাজ্যের স্বাস্থ্য মানসিক স্বাস্থ্যবিধি দপ্তরের জন্ম-মৃত্যু পরিসংখ্যান ব্যুরো (New York City Department of Health and Mental Hygiene's Bureau of Vital Statistics), 2021। অ্যালকোহল, ওষুধের ব্যবহার, প্রতিরোধ, পরিচর্যা ও চিকিৎসা বিষয়ক ব্যুরো (Bureau of Alcohol, Drug Use, Prevention, Care and Treatment)-এর বিশ্লেষণ। 2021 সালের এই ডেটা সাময়িক এবং পরিবর্তনসাপেক্ষ।