

과다 복용으로 인한 사망(백인 뉴욕 시민), 2022년


772 명 백인 뉴욕 시민은 약물 과다 복용으로 사망했습니다.

36.5 명 백인 뉴욕 시민이 100,000명당 약물 과다 복용으로 사망했습니다.


백인 뉴욕 시민은 과다 복용으로 인한 사망자 수가 가장 많았습니다.




백인 뉴욕 시민은 과다 복용으로 인한 사망자 수(100,000명의 주민당)가 세 번째로 가장 많았습니다.




백인 뉴욕 시민의 약물 과다 복용으로 인한 사망률은 남성과 35~54세에서 가장 높았습니다.




Brooklyn은 백인 주민의 과다 복용으로 인한 사망자 수가 가장 높았습니다.



Bronx는 흑인 주민의 약물 과다 복용으로 인한 사망률이 가장 높았습니다.



백인 뉴욕 시민의 약물 과다 복용으로 인한 사망과 관련된 물질(과다 복용으로 인한 사망에는 두 가지 이상의 물질이 포함될 수 있음):



출처: 과다 복용으로 인한 사망률 데이터는 15세~84세의 사람들로 제한되었으며, 2022년 뉴욕시 수석 법의관실(Office of the Chief Medical Examiner)과 뉴욕시 보건 및 정신 위생국(Department of Health and Mental)의 인구통계국(Bureau of Vital Statistics)의 데이터를 참조하였습니다. 알코올, 약물 사용, 예방, 관리 및 치료 부서별 분석. 2022년 자료는 잠정치이며 변경될 수 있습니다. 2022년 자료는 잠정치이며 변경될 수 있습니다.
Korean

