


Эта схема поможет вам снизить риск причинения вреда здоровью во время инъекций наркотиков.



Советы на случай повторного использования шприцев

- Не следует использовать шприц повторно, если этого можно избежать. Повторное использование шприца, как и надевание на него колпачка, приводит к загрязнению иглы, что может вызвать заражение и абсцессы мягких тканей.
- Если вам нужны новые стерильные шприцы, можно выполнить следующее:
 - Обратиться в местный пункт SSP (Программы предоставления шприцев) и получить стерильные расходные материалы для употребляющих наркотики или налоксон. Найти пункт SSP можно на веб-странице nyc.gov/health, выполнив поиск по словам **syringe service programs** (программы предоставления шприцев).
 - Отправиться к поставщику программы расширенного доступа к шприцам (Expanded Syringe Access Program, ESAP) Поставщиков ESAP, которые отпускают или выдают стерильные шприцы, можно найти в аптеках. Найти ближайшую участвующую в программе ESAP аптеку можно на веб-странице health.ny.gov, выполнив поиск по названию **ESAP**.
- Если использования того же шприца не избежать, промойте его перед повторным использованием.
 - Если у вас есть отбеливатель:
 - **Шаг 1.** Наполните шприц бутилированной или холодной водопроводной водой. Постучите по шприцу. Выпустите воду и повторите эти действия не менее трех раз.
 - **Шаг 2.** Наполните шприц отбеливателем. Постучите по шприцу. Выпустите отбеливатель и повторите эти действия не менее трех раз.
 - **Шаг 3.** Повторите шаг 1.
 - Если у вас нет отбеливателя, выполните только шаг 1, приведенный выше. Промыть водой безопаснее, чем совсем не промывать.
- При проведении инъекции обопритесь руками о плоскую поверхность.
- Храните шприцы с закрытыми иглами в сухом месте в положении иглой вверх.