

## Как проверить наркотики на содержание ксилазина с помощью тест-полосок

В некоторых партиях наркотических средств, циркулирующих в г. Нью-Йорке, обнаружен ксилазин — успокоительное средство для животных, широко известное как «транквилизатор». Ксилазин может вызывать сильный седативный эффект, что увеличивает риск передозировки, и появление на коже серьезных ран. Тест-полоски помогают определить наличие ксилазина в наркотиках, которые вы собираетесь употреблять.

### Как проверить наркотики на наличие ксилазина?

1. Насыпьте 10 миллиграмм (мг) наркотического средства (этого количества достаточно, чтобы покрыть волосы Авраама Линкольна на одноцентовой монете) в чистую сухую емкость (например, медицинский мерный стакан) или пластиковую мерную ложку (при наличии).
  - Если вы не можете проверить 10 мг наркотика, поместите хотя бы несколько крупиц в чистую сухую емкость.
2. Налейте в емкость 5 миллилитров (1 чайную ложку) воды и перемешайте.
3. Опустите тест-полоску в воду стороной, отмеченной волнами. Подождите 15 секунд, чтобы полоска впитала воду.
4. Выньте полоску из воды и положите ее на ровную поверхность на 5 минут, прежде чем проверить результаты. Обратите внимание, что результаты следует проверять не позже, чем через 10 минут после того, как вы вынули полоску из воды.

При наличии тест-полосок для фентанила их можно использовать на том же образце, что и полоски для ксилазина.

### Что означают результаты?

Одна линия — **положительный результат**. Это значит, что в ваших наркотиках обнаружен ксилазин. Смотрите раздел «Что делать, если тест показал положительный результат или я предполагаю, что в моих наркотиках содержится ксилазин?».



Две линии (даже если вторая едва заметна) — **отрицательный результат**. Это значит, что в ваших наркотиках **не** обнаружен ксилазин. Помните, что ни один тест не является точным на 100 %, и ваши наркотики все равно могут содержать ксилазин.



Отсутствие линий или одна линия ближе к стороне с волнами — **недействительный результат**. Это значит, что нужно провести проверку повторно, используя новую полоску.



Помните, что ни один тест не является точным на 100 %. Определенные условия могут увеличить шансы на получение ложноположительного (например, если в наркотиках содержатся определенные вещества, в частности, лидокаин) или ложноотрицательного результата (например, образец, который вы тестировали, не содержит ксилазина, но в целом в ваших наркотиках он присутствует).

### **Что делать, если тест показал положительный результат или я предполагаю, что в моих наркотиках содержится ксилазин?**

- Старайтесь не использовать эти наркотики, особенно когда вы одни или в месте, где может быть опасно пребывать без сознания в течение длительного времени.
- Используйте их под наблюдением в центре профилактики передозировки.
- Если у вас есть раны на коже, дальнейшее употребление ксилазина может ухудшить их состояние. Если раны не заживают, поговорите со своим лечащим врачом. Чтобы получить помощь в поиске врача, звоните по номеру **311** или 844-692-4692.

### **Где можно получить тест-полоски для проверки на содержание ксилазина?**

Тест-полоски для личного использования можно заказать у производителей онлайн, в частности, на сайте MATTERS Network [mattersnetwork.org/request-test-strips](https://mattersnetwork.org/request-test-strips).

### **Как можно уменьшить риск передозировки опиоидами?**

Ксилазин — это не опиоид. Тем не менее, в г. Нью-Йорке ксилазин был обнаружен только в тех наркотиках, которые также содержат фентанил (это очень сильный опиоид). Если вы используете наркотики, содержащие ксилазин, примите нижеперечисленные меры предосторожности, чтобы уменьшить риск передозировки опиоидами.

- Избегайте употребления наркотиков, когда с вами рядом никого нет. Употребляйте наркотики вместе с другими людьми по очереди.
  - Если вы собираетесь употребить их в одиночестве, позвоните на горячую линию Never Use Alone (Никогда не употребляйте в одиночестве) по телефону 800-484-3731.
- Перед употреблением наркотиков попросите человека, которому доверяете, регулярно проверять ваше состояние.
- Употребляйте медленно и в небольших количествах.
- Избегайте смешивания с другими наркотиками.
- Приобретите налоксон, безопасное и легкое в использовании лекарство, которое может устранить последствия опиоидной передозировки (даже если человек находится в седативном состоянии под влиянием ксилазина). Позвоните по номеру **311**, чтобы узнать, где можно бесплатно получить налоксон.

Дополнительная информация, включая рекомендации по лечению и услуги по снижению пагубного воздействия наркотиков и их проверке, доступна на странице [nyc.gov/alcoholanddrugs](https://nyc.gov/alcoholanddrugs). Если у вас есть вопросы касательно тестирования ваших наркотиков, пишите на электронную почту [drugchecking@health.nyc.gov](mailto:drugchecking@health.nyc.gov).