


שפילן א ביסל מיטן תחת?

היט זיך אפ,
דער שילשול זאל זיך נישט
פארשפרייטן דורכן געשליכט.



באזוכט אייער דאקטאר אויב איר האט סימפטאמען.
זעהט די פארקערטער זייט פונעם קארטל פאר מער
אינפארמאציע.

קלינגט אן **311** אדער באזוכט
nyc.gov/health/clinics
אויסצוזוכן א נידריג-קאסט אדער
אומזיצטע העפאטיטיס A וואקסין.

שילשול-אינפעקציעס קענען זיך פארשפרייטן דורך געשליכט צווישן מענער וואס שלאפן מיט אנדערע מענער.

שפילן מיטן תחת, מיטן פינגער, צונג, פיסט, און שפילצייג, און אנאל-געשליכט קענען פאראורזאכן שילשול-אינפעקציע.

סײ וועלכע קאנטאקט מיטן אפפאל (ארויסגאנג) קענען פאראורזאכן אינפעקציעס ווי אמעביאסיס, קריפטאספארידיאסיס, העפאטיטיס A און שיגעלאסיס.

ווי קען איך זיך היטן?

- + ווארט צוויי וואך נאכן האבן שילשול צו האבן סעקס.
- + וואשט אפ אייערע הענט, אבר, תחת, און שפילצייג מיט זייף און וואסער פאר און נאך געשליכט.
- + באקומט די העפאטיטיס A וואקסין.
- + אויב איר האט סימפטאמען, באזוכט אייער דאקטער אדער גייט צו אן אורז'ענט-קייר פאסיליטי.

באמערקט סימפטאמען ווי:

- + שילשול
- + מאגן-וויי אדער אנגעבלאזנקייט
- + פיבער
- + חלשות
- + דאס פארגעלט ווערן פון די אויגן אדער דער הויט (ז'אנדיס, א סימן פון העפאטיטיס A אינפעקציע)

קלינגט אן 311 אדער באזוכט

nyc.gov/health/clinics

אויסצוזוכן א נידריג-קאסט אדער אומזיצטע העפאטיטיס A וואקסין.