

נוצט איר דראגס?

# פארמינערט אייער ריזיקע



פון איבערדאזע,  
העפעטייטיס C און HIV.

## פארמיידט איבערדאזע (Overdose, OD)

**+** זוכט אונטער אייערע דראגס נוצנדיג פענטאניל טעסט סטריפס. אויב עס איז פאזיטיוו, נעמט אין באטראכט עס נישט צו נוצן. אויב איר פלאנט יא עס צו נוצן, דאן הויבט אן מיט א קליינע מאס און גייט צוביסלעך. באזוכט [nyc.gov/health/fentanyl](http://nyc.gov/health/fentanyl) צו זען וואו צו באקומען פענטאניל טעסט סטריפס.

**+** נוצט עס נישט ווען איר זענט אליינס און נעמט רייעס צו זיין ניכטער. אויב איר נוצט יא ווען איר זענט אליינס, רופט די Never Use Alone (נוצט קיינמאל נישט אליינס) האטליין אויף 800-484-3731.

**+** מישט נישט צאם דראגס, אריינגערעכנט אלקאהאל.

**+** האלט nalaxone גרייט און נאנט צו דער האנט. Naloxone איז א זיכערע און גרינג-צו-נעמען מעדיצין וואס דרייט צוריק די אפעקטן פון אפיאוידס ווי העראין, מעדיצין פאר ווייטאג און פענטאניל. רופט 311, אדער באזוכט [nyc.gov/health](http://nyc.gov/health) און זוכט פאר nalaxone צו זען וואו איר קענט באקומען א פושקע אומזיסט.

**+** געבט אכטונג אויב איר האט נישט גענוצט פאר א לענגערע צייט.

אייער שטאפל פון וויפיל איר קענט פארנעמען קען זיין נידריגער, וואס מאכט אייך מער אין ריזיקע פאר אן איבערדאזע.

**+** רעאגירט צו אן איבערדאזע. אויב איר זענט מיט איינער וואס איר טראכט ליידט פון אן איבערדאזע, דאן געבט יענעם nalaxone און רופט 911. זאגט פאר די אפערעיטער אז איינער אטעמט נישט.



# פארמיידט העפאטיטיס C (העפ C) און HIV

העפ C און HIV זענען ווירוסן וואס געפונען זיך אין די בלוט. נוצן די זעלבע דראג געצייג, אריינגערעכנט איינשפריצן, קאכערס, וואטע און וואסער, מיט איינער וואס האט העפ C אדער HIV קען אייך אינפעקטירן. העפ C קען שעדיגן אייער לעבער, און עס איז נישטא קיין היילונג פאר HIV, אפילו מיט מעדיצין.



## + נוצט אלעמאל נייע געצייג.

עס זענען פארהאן אנאנימע פראגראמען אין ניו יארק סיטי וועלכע שטעלן צו אומזיסטע איינשפריצן און דראג באנוץ געצייג.

## + טיילט קיינמאל נישט מיט געצייג,

אריינגערעכנט אויב איר שפריצט אריין, אטעמט אדער רייכערט דראגס.

## עמערזשענסי איבערדאזע אנווייזונגען

### 1. רופט 911.

### 2. געבט naloxone אויב איר האט עס.

שפריצט נאז naloxone אריין אינעם נאז, אדער געבט אן איינשפריץ פון אינטראמוסקולער naloxone אינעם אויבערשטע ארעם אדער פיס. אויב עס איז נישטא קיין רעאקציע ביז צוויי מינוט, געבט א צווייטע דאזע.

### 3. לייגט דעם מענטש ליגנדיג אויף זייער זייט. ווארט פאר הילף אנצוקומען.

## הילפסמיטלען

+ אומזיסטע און ביליגע איינשפריצן: פרעגט ביי ארטיגע אפטייקן, אדער באזוכט [nyc.gov/alcoholanddrugs](http://nyc.gov/alcoholanddrugs) פאר א ליסטע פון איינשפריץ סערוויס פראגראמען.

+ העפ C טעסטינג און באהאנדלונג: רופט 311, אדער באזוכט [nyc.gov/health/hepc](http://nyc.gov/health/hepc).

+ HIV טעסטינג און באהאנדלונג: רופט 311, אדער באזוכט [nyc.gov/health/hiv](http://nyc.gov/health/hiv).

+ שטיצע און הילפסמיטלען פאר גייסטישע געזונטהייט: רופט 888-692-9355, אדער באזוכט [nyc.gov/nycwell](http://nyc.gov/nycwell).