



Curte um beijo grego?

Evite a transmissão de
diarreia durante a prática
de anilingus.

Ligue para 311 ou **acesse nyc.gov/health/clinics**
e saiba onde tomar a vacina contra a hepatite A
gratuitamente ou por um valor acessível.

Se os sintomas persistirem, procure um
médico. Consulte mais informações no
verso deste cartão.

Infecções como a diarreia podem ser transmitidas durante o sexo entre homens.

Práticas sexuais que envolvem o ânus, como inserção de dedos, fisting, anilingus, uso de brinquedos sexuais e sexo anal podem provocar infecção diarreica.

Qualquer contato com as fezes pode favorecer o surgimento de infecções como amebíase, criptosporidiose, giardíase, hepatite A e shigelose.

Fique atento a sintomas como:

- + Diarreia
- + Dores ou inchaços abdominais
- + Febre
- + Náuseas
- + Amarelamento da pele ou dos olhos (icterícia, um sintoma de hepatite A)

Como posso me proteger?

- + Aguarde duas semanas após o episódio de diarreia para ter relações sexuais.
- + Lave bem as mãos, o pênis, o ânus e brinquedos sexuais com água e sabão antes e depois de relações sexuais.
- + Tome a vacina contra a hepatite A.
- + Se os sintomas persistirem, consulte um médico ou procure uma unidade de pronto-atendimento.

Ligue para 311 ou **acesse nyc.gov/health/clinics** e saiba onde tomar a vacina contra a hepatite A gratuitamente ou por um valor acessível.

Portuguese

