

COVID-19 疫苗附加劑與加強針

	用於免疫功能低下者的附加劑疫苗	加強針
它是什麼？	提供給接種之前劑量的疫苗後未出現足夠強烈免疫反應的人士接種的額外一劑疫苗	可提供額外保護的額外一劑疫苗
誰有資格接種疫苗？	年齡 5 歲 及以上、免疫功能中度或重度低下的人士	年齡 12 歲 及以上者
為何接種？	部分免疫功能低下者對疫苗的免疫反應不夠強。第三劑疫苗可能改善其免疫反應。	疫苗依然對重症有著很好的預防作用，但對輕度至中度感染的防護可能沒那麼強，或者可能隨著時間的推移而減弱。
使用哪些品牌的疫苗？	<ul style="list-style-type: none"> 如果您接種了輝瑞 (Pfizer) 或莫德納 (Moderna) 疫苗，請盡可能接種與前兩劑相同的品牌。 如果您接種了強生 (Johnson & Johnson) 或其他疫苗，請接種輝瑞或莫德納疫苗。 	可以與您最初接種的疫苗為同一品牌，也可以是不同的品牌。輝瑞和莫德納疫苗為首選。
我什麼時候有資格接種？	完成第二劑輝瑞或莫德納疫苗、單劑強生疫苗接種的至少 28 天 後。	<ul style="list-style-type: none"> 如果您接種了輝瑞或莫德納疫苗，則在您接種完第二劑疫苗的至少五個月後（如果您有中度或重度免疫功能低下，則在您接種完附加劑疫苗的至少三個月後）。 如果您接種了強生疫苗，則在您接種完疫苗的至少兩個月後
我需要提供什麼文件？	年齡證明。您還需要確認您有符合接種條件的醫療狀況。如果您有疫苗接種卡，請帶上它。	年齡證明。如果您有疫苗接種卡，請帶上它。
會有副作用嗎？	您可能感受到一些副作用反應，例如手臂酸痛、頭痛、身體酸痛、疲倦和發燒。	您可能感受到一些副作用反應，例如手臂酸痛、頭痛、身體酸痛、疲倦和發燒。
是否免費？	是的。	是的。
何處可以瞭解更多資訊？	閱讀 on.nyc.gov/additionaldose 。	閱讀 on.nyc.gov/vaccinefacts 。

如需查找疫苗接種站點，請造訪 nyc.gov/vaccinefinder 或致電 877-829-4692。如需更多資訊，請造訪 nyc.gov/covidvaccine。

紐約市衛生局或順應形勢發展而調整建議。

3.15.22