

איינרעדענישן און פאקטן איבער ביופרענאָרפּין צו באהאנדלען אפיויד באנוץ קראנקהייט

עס זענען דא מעדיצינען וואס זענען באשטעטיגט דורך די פאראייניגטע שטאטן עסנווארג און דראג אדמיניסטראציע (U.S. Food and Drug Administration), ווי ביופרענאָרפּין (גערופן אין קורצן "ביופ" אדער מיט ברענד נעיס ווי Suboxone און Zubsolv), וואס זענען דא צו באקומען צו באהאנדלען אפיויד באנוץ קראנקהייט (opioid use disorder, OUD), צו אויפהערן נוצן אדער נוצן ווייניגער אפיויד און צו קאנטראלירן גלוסטענישן און סימפטאמען וואס געשעהען ווען די קערפער באקומט נישט אפיוידס נאך עס האט זיך צוגעוואוינט דערצו. לייענט ווייטער צו לערנען מער איבער טייל פון די פארשפרייטע איינרעדענישן און אמת'ע פאקטן איבער ביופ און OUD.

פאקטן	איינרעדענישן
<p>OUD איז א כראנישע געזונטהייט פראבלעם וואס קען באהאנדלט ווערן און קאנטראלירט ווערן מיט מעדיצין. נעמען א מעדיצין צו באהאנדלען OUD איז ווי נעמען אינסולין צו באהאנדלען צוקער קראנקהייט.</p>	<p>נעמען מעדיצין פאר OUD ערזעצט איין אדיקשען מיט אן אנדערע.</p>
<p>ערהוילונג איז א פראצעדור פון א טויש, אין וועלכע מענטשן פארבעסערן זייער געזונטהייט און וואוילזיין דורכן אוועקשטעלן זייערע אייגענע ציהלן און שטרעבן צו ערפילן זייער פולע פאטענציאל. נעמען מעדיצינען ווי ביופ און מעטאדאָן איז א זאך וואס פאלט אריין אונטער די קאטעגאריע פון ערהוילונג.</p>	<p>נעמען מעדיצין פאר OUD מיינט אז איר זענט נישט עכט אין ערהוילונג.</p>
<p>OUD איז א כראנישע מעדיצינישע פראבלעם, נישט א מאראלישע שוואכקייט, און גלוסטענישן פאר אפיוידס זענען נאטורליכע רעאקציעס וואס געשעהען אפגעזעהן פון ווי שטארק דעם מענטשן'ס כוח הרצון איז. פילע מענטשן זענען נישט אומשטאנד צו אויפהערן נוצן אדער נוצן ווייניגער אפיויד אן נעמען א מעדיצין. ערהוילונג פון OUD האט נישט צו טוהן מיט אויב א מענטש הערט אויף נוצן אפיוידס פון איין מינוט אויפן צווייטן. מענטשן וואס הערן אויף נוצן אפיוידס אויף איין מאל אדער גייען באקומען א 'דיטאָקס' און גייען צוריק אהיים אן אנהויבן ביופ אדער מעטאדאָן זענען אין א העכערע סכנה פון אן אָווערדאָז.</p>	<p>מענטשן מיט OUD דארפן צו קענען אויפהערן נוצן אפיוידס פון איין מינוט אויפן צווייטן אן נעמען ביופ צו באהאנדלען זייער OUD. נעמען ביופ פאר OUD מיינט אז אייער כוח הרצון איז שוואכער פון מענטשן וואס נעמען נישט ביופ.</p>
<p>אינגאנצן אויפהערן נוצן אלע דראגס איז נישט פארלאנגט צו זיכערערהייט אנהויבן נעמען ביופ און צו בענעפיטירן דערפון. עס איז אבער וויכטיג נישט צו נוצן סיי וועלכע אפיוידס פאר א געוויסע מאס פון צייט בעפארן נעמען אייער ערשטע דאזע פון ביופ. רעדט מיט אייער העלט קעיר פראָוויידער איבער וויאזוי צו זיכערערהייט אנהויבן ביופ צו פארמיידן סימפטאמען וואס געשעהען ווען די קערפער באקומט נישט אפיוידס ווען עס איז צוגעוואוינט דערצו.</p>	<p>ביופ באהאנדלונג דארף אפגעשטעלט ווערן אדער נישט אנגעהויבן ווערן פאר מענטשן וואס נוצן אקטיווערהייט דראגס.</p>
<p>עס איז נישטא א ספעציפישע מאס פון צייט ווי לאנג איינער זאל דארפן נעמען ביופ. מענטשן מיט OUD זאלן נעמען ביופ פאר אזוי לאנג וואס זיי בענעפיטירן דערפון, און דאס קען זיין יארן אדער זייער גאנצע לעבן. רוב מענטשן וואס נעמען ביופ פאר לענגערע צייט אפשניטן זעהען בעסערע תוצאות ווי מענטשן וואס נעמען עס פאר א קורצערע צייט.</p>	<p>ביופ באהאנדלונג דארף זיין פאר א קורצע צייט אדער דארף עס אפגעשטעלט ווערן נאך א געוויסע מאס פון צייט.</p>

איינרעדענישן

פאקטן

**ביזא האט נישט קיין בענעפיט
אן קאונסעלינג אדער טעראפי.**

באהאנדלונג און ערהוילונג זענען אנדערש פאר יעדן איינעם.
כאטש פילע מענטשן בענעפיטירן פון קאונסעלינג אדער
טעראפי, איז ביזא גאר ווירקזאם ביים באהאנדלען OUD,
אפילו ווען עס ווערט גענומען אן קאונסעלינג אדער טעראפי.

**ביזא וועט אפט אביוזט
(גענומען נישט ווי פארשריבן
אדער אנגעוויזן אדער גענומען
אן א פרעסקריפשען).**

ביזא, פונקט ווי אנדערע מעדיצינען, קען אביוזט ווערן. צוליב
דעם וואס ביזא איז שוואכער פון אנדערע אפיוידס, ווי העראָואין
אדער פענטאניל, ווערט עס נישט געווענטליך גענוצט צו ווערן
"הויעך" (היי). געוויסע מענטשן קענען מעגליך נעמען ביזא אן א
פרעסקריפשען ווייל זיי האבן נישט קיין צוטריט צו באהאנדלונג
פראָווידערס, און דאס נעמען העלפט זיי פארמיידן סימפטאמען
וואס געשעהען ווען די קערפער באקומט נישט אפיוידס ווען עס
איז צוגעוואוינט דערצו, אדער העלפט עס זיי אויפהערן נוצן אדער
נוצן ווייניגער אפיוידס.

**עס איז גרינג צו באקומען
אן אָווערדאָוז פון ביזא.**

עס איז גאר שווער צו באקומען אן אָווערדאָוז פון ביזא אליון.
ביזא האט א "דאך עפעקט", דאס הייסט אז נאכן נעמען א
געוויסע מאס דערפון, וועט דאס נעמען מער ביזא נישט מאכן
"הויעך" אדער מאכן אטעמען שטייטער אדער ווייניגער טיף.
דאס מיינט אז אפילו אויב איינער נעמט מער ביזא פון וויפיל זיי
זענען פארשריבן געווארן, וועט דאס נישט פאראורזאכן אז זיי
זאלן מער איינגעשלעפערט ווערן אדער אטעמען שטייטער.
אויב איינער באקומט אן אָווערדאָוז פון ביזא, איז דאס געווענטליך
ווייל זיי האבן אויך גענומען אנדערע דראגס וואס פארשטייטערן די
אטעמען, ווי א בענזאָודייעזעפין אדער אלקאהאל.

**ביזא ארבעט נישט אויב איר
נוצט פענטאניל.**

ביזא ארבעט דאס זעלבע פאר אלע אפיוידס, אריינרעכענענדיג
פענטאניל, דורכן קאנטראלירן די סימפטאמען וואס געשעהען
ווען די קערפער באקומט נישט אפיוידס צו וועלכע עס איז
צוגעוואוינט און דורכן פארקלענערן די סכנה פון אָווערדאָוז.
אבער אנהויבן צו נעמען ביזא צו שנעל נאכן נוצן פענטאניל קען
פאראורזאכן פלוצלינגדיגע סימפטאמען וואס געשעהען ביים
אויפהערן נעמען אפיוידס. רעדט מיט אייער פראָווידער איבער
ווען צו אנהויבן נעמען ביזא כדי צו פארמיידן די ווירקונגען.

פאר מער אינפארמאציע און פאר הילף צו טרעפן ביזא, באזוכט
[nyc.gov/health](https://www.nyc.gov/health) און זוכט פאר "bup treatment" (ביזא באהאנדלונג).

פאר הילף צו טרעפן א העלט קעיר פראָווידער,
רופט **311** אדער 844-692-4692.

פאר גייסטישע געזונטהייט אדער דראג באנוץ שטיצע רופט אדער טעקסט 988
אדער שיקט א מעסעדזש אויף [nyc.gov/988](https://www.nyc.gov/988). טעקסט און די אנליין מעסעדזש
סערוויסעס זענען דא צו באקומען אין ענגליש און ספאניש, און קאונסעלארס
זענען אוועילעבעל אויפן טעלעפאן 24/7 אין מער פון 200 שפראכן.