



沉迷於 舌尖 快感？

在肛口性愛遊戲時
避免腹瀉傳染。

請致電 311 或造訪 nyc.gov/health/clinics
以瞭解哪裡可以獲得費用低廉或免費的
A 型肝炎疫苗。

如果出現相關症狀，請及時就醫。
如需詳細資訊，請查看此卡片背面。

腹瀉感染可以在與男性發生性行為的男性群體間散播。

肛交性愛遊戲，例如指交、口交、拳交、使用肛門性愛玩具和肛交等，可能會導致腹瀉感染。任何與糞便的接觸都可能導致感染，如阿米巴症、隱孢子蟲症、賈第氏滴蟲感染症、A 型肝炎和志賀式桿菌病。

請注意下列症狀：

- + 腹瀉
- + 胃痙攣或腹脹
- + 發燒
- + 噁心
- + 皮膚或眼睛發黃
(黃疸，A 型肝炎感染的徵兆)

如何保護自己？

- + 腹瀉後兩週再發生性行為。
- + 在性行為前後用肥皂和水清洗雙手、陰莖、臀部和性愛玩具。
- + 接種 A 型肝炎疫苗。
- + 如出現相關症狀，請及時就醫或前往緊急照護機構處就診。

請致電 311 或 造訪 [nyc.gov/health/clinics](https://www.nyc.gov/health/clinics)

以瞭解哪裡可以獲得費用低廉或免費的 A 型肝炎疫苗。

Traditional Chinese