



沉醉于 舌尖 欢愉？

防止腹泻感染在肛口
性行为中传播。

请致电 311 或访问 nyc.gov/health/clinics
以查找何处提供低价或免费的甲肝疫苗。

如果您出现相关症状，请及时就医。
请查看此卡背面，了解更多信息。

NYC
Health

腹泻感染可以通过男性间性行为进行传播。

肛交游戏（例如手指性行为、肛吻、拳指性行为、使用肛交玩具以及肛交行为）可能导致腹泻感染。

任何粪便接触均可导致变形虫病、隐孢子虫病、贾第虫病、甲肝以及志贺氏菌病等传染性疾病。

需要注意的症状如下：

- + 腹泻
- + 胃痉挛或胃胀
- + 发烧
- + 恶心
- + 眼睛或皮肤发黄（黄疸，感染甲肝的迹象）

如何保护自己？

- + 出现腹泻症状两周后再进行性生活。
- + 性行为前后使用肥皂和清水清洗双手、阴茎、臀部和情趣玩具。
- + 接种甲肝疫苗。
- + 如果您出现相关症状，请及时就医或前往紧急护理机构。

请致电 311 或访问 nyc.gov/health/clinics
以查找何处提供低价或免费的甲肝疫苗。

Simplified Chinese

