


人乳頭狀瘤病毒 (HPV) 疫苗： 保護您的孩子不得癌症的安全有效方法

每年有 3.73 萬例癌症由 HPV 引起

相當於全年每天每 15 分鐘有一人患癌。

人乳頭狀瘤病毒
(Human papillomavirus,
HPV) 十分常見。

- 每年有 1,300 萬美國人被確診感染 HPV，其中半數以上年齡在 14 至 24 歲之間。



*喉嚨後部的癌症，包括舌根與扁桃體

HPV 疫苗非常有效。

- 該疫苗可預防最常見類型的致癌 HPV。
- 疫苗獲許可前的大規模研究顯示，該疫苗：
 - 預防子宮頸癌、陰道癌和外陰癌前期病變的有效率近乎 100%
 - 預防肛門癌前期病變的有效率達 75%
- 更多的近期研究顯示：
 - 於 17 歲前接種該疫苗的女孩和婦女罹患子宮頸癌的風險降低了 88%
 - 口腔和口咽部 HPV 感染減少了 82% 以上
- 自推出以來，該疫苗所預防的 HPV 感染在少女和年輕女性中減少了 80% 以上。
- 該疫苗已證明可使 21 歲及以下男性中的生殖器疣病例減少 82%。
- 截至目前的證據顯示，該疫苗的保護作用效力持久。接種 HPV 疫苗可以預防 90% 以上由 HPV 引起的癌症生成。

HPV 疫苗是安全的。

- 在該疫苗獲得許可之前，健康專家對其進行了研究。他們發現，接種疫苗後出現嚴重健康問題的情況很少見，且發生率與未接種疫苗者的情況相近。
- 2006 年問世以來，該疫苗已在全球接種了超過 2.7 億劑。
- 健康專家在持續監測該疫苗的安全性。17 年來，未出現與疫苗接種相關的嚴重安全問題。
- 所報告的最常見副作用均輕微且短暫，其中包括：
 - 注射部位疼痛（10 人中約有 8 人受到影響）
 - 注射部位發紅或腫脹（4 人中有 1 人）
 - 低燒（10 人中有 1 人）
 - 噁心和頭痛（3 人中有 1 人）
 - 暈眩或暈厥：在接種任何疫苗之後，青少年群體比一般人群更經常出現暈眩或暈厥的情況。
- 與其它疫苗同時接種 HPV 疫苗是安全的。您的孩子前去接種百日咳混合疫苗 (Tdap)、腦膜炎球菌疫苗、流感和 COVID-19 疫苗時，不妨順便接種 HPV 疫苗。

HPV 疫苗可以拯救您的孩子的生命。

今天就詢問孩子的健康照護提供者，瞭解該疫苗的相關事宜。
請務必讓您的孩子在 13 歲前接種，此為該疫苗最有效的階段。

NYC
Health