

Jak przyjmować doksycyklinę w ramach profilaktyki poekspozycyjnej Doxy PEP

Przyjmowanie antybiotyku w postaci doksycykliny w ramach profilaktyki poekspozycyjnej Doxy PEP po odbywaniu stosunków płciowych bez zabezpieczenia – oralnych, analnych lub waginalnych, podczas których nie są stosowane prezerwatywy – mogą doprowadzić do zakażenia kiłą, rzeżączką i chłamydią.

Metoda profilaktyki Doxy PEP jest najbardziej skuteczna w przypadku przyjęcia dawki antybiotyku przed upływem 24 godzin od odbycia stosunku płciowego bez zabezpieczenia.

Stosunek płciowy co najmniej raz dziennie

Należy przyjąć 100 mg doksycykliny w tabletkach w ciągu 24 godzin (i nie później niż 72 godzin) od odbycia stosunku płciowego bez zabezpieczenia.

Należy przyjmować doksycyklinę tak często, jak często są odbywane stosunki płciowe bez zabezpieczenia, jednak **w dawce nieprzekraczającej 200 mg (dwie tabletki po 100 mg) na 24 godziny.**

Należy przyjąć ostatnią dawkę nie później niż 24 godziny od przyjęcia dawki poprzedzającej oraz nie później niż 72 godziny od odbycia ostatniego stosunku płciowego bez zabezpieczenia.

