

Doxy PEP لینے کا طریقہ

بغیر کنڈوم کے جنسی تعلق کے بعد Doxy PEP (اینٹی بائیوٹک doxycycline) لینا — منہ کے ذریعے، مقعدی یا فرجی کے ساتھ جنسی تعلق جب کنڈوم پورے وقت استعمال نہ کیا جائے — آپ کے آتشک، سوزاک اور کلیمانڈیا ہونے کے امکانات کو کم کرتا ہے۔

Doxy PEP بہترین کام کرتا ہے اگر کنڈوم کے بغیر جنسی تعلق کے 24 گھنٹوں کے اندر لیا جائے۔

روزانہ جنسی تعلقات (یا زیادہ)

کنڈوم کے بغیر جنسی تعلقات کے بعد 24 گھنٹوں کے اندر (اور 72 گھنٹے کے بعد نہیں) ڈوکسی سائکلائن کی دو 100 ملی گرام (ملی گرام) گولیاں لیں۔

کنڈوم کے بغیر جنسی تعلق بناتے وقت روزانہ جتنی بار ڈوکسی سائکلائن لیں لیکن 24 گھنٹے کی مدت میں 200 ملی گرام (دو 100 ملی گرام گولیاں) سے زیادہ نہ لیں۔

آخری خوراک پچھلی خوراک کے کم از کم 24 گھنٹے بعد اور پچھلی بار بغیر کنڈوم کے جنسی تعلقات کے 72 گھنٹوں کے اندر لیں۔

جنسی تعلقات کے بعد دو گولیاں لیں



24 گھنٹے

48 گھنٹے

72 گھنٹے

مثالی ٹائم فریم

قابل قبول ٹائم فریم

جنسی صحت کلینک کی خدمات، مقامات اور اوقات کے بارے میں تازہ ترین معلومات کے لیے، QR کوڈ اسکین کریں، 311 پر کال کریں یا [nyc.gov/health/sexualhealthclinics](https://www.nyc.gov/health/sexualhealthclinics) پر ملاحظہ کریں۔ STI ریپڈ ٹیسٹنگ کے لیے ایکسپریس کلینک اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے، bit.ly/sti-scheduling پر جائیں۔ HIV، STI، مانع حمل اور دوا دینے کے اسقاط حمل سے متعلق ٹیلی میڈیسن کی خدمات کے لیے، پیر تا جمعہ، صبح 9 بجے سے دوپہر 3:30 بجے تک جنسی صحت کلینک کی ہاٹ لائن 347-396-7959 پر کال کریں۔

